



СПАЗМАЛИТ

40 мг

СПАЗМОЛИТИК
МИОТРОПНОГО ДЕЙСТВИЯ

- Быстро и эффективно снимает спазмы гладкой мускулатуры

Торговое название: Спазмалит

Международное название: Дротаверин

Лекарственная форма: таблетки

Состав: 1 таблетка содержит
40 мг дротаверина гидрохлорида

Фармакологическая группа:

Спазмолитик миотропного действия

Фармакологическое действие:

Оказывает спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру посредством селективного ингибирования фосфодиэстеразы. Препарат эффективен при спазмах гладкой мускулатуры, как нервной, так и мышечной этиологии. Расширяет кровеносные сосуды, в том числе и коронарные сосуды сердца, умеренно снижает АД. По выраженности и продолжительности действия превосходит папаверин. Препарат хорошо всасывается из ЖКТ с созданием максимальной концентрации в плазме крови через 45-60 минут после перорального приема.

40 мг

СПАЗМАЛИТ



Показания к применению:

Профилактика и лечение функциональных состояний и болевого синдрома, связанных со спазмом гладкой мускулатуры, в т.ч. при хроническом гастродуодените, хроническом холецистите, холелитиазе, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, спазмах пилорического и кардиального отделов желудка, спастическом колите, почечно-каменной болезни, пиелите, цистите.

Альгодисменорея.

Для снятия спазма шейки матки при родах и ослабления сокращений матки. Спазмы периферических артериальных сосудов, сосудов головного мозга. Профилактика спазмов гладкой мускулатуры при проведении инструментальных исследований.

Способы применения и дозы:

Взрослым назначают внутрь по 40-80 мг 2-3 раза в сутки. Для детей в возрасте 1-6 лет суточная доза составляет 10-40 мг, в возрасте старше 6 лет - 20-40 мг (в 1-2 приема). Кратность назначения 1-2 раза в сутки.

Побочное действие:

Головная боль, слабость, сердцебиение, сухость во рту; запоры, аллергические реакции.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость, гипертрофия предстательной железы; глаукома.